

Durée :

4 heures

Les Participants :

Toute personne susceptible d'utiliser un DAE...

Notre Choix Pédagogique :

- Alternance d'apports théoriques et de pratique : mise en situation et réalisation de gestes à l'aide de mannequins adulte / enfant / nourrisson / utilisation du défibrillateur.
- Supports audio visuels adaptés.
- Les principes acquis lors de cette formation sont applicables hors du cadre professionnel.

Notre intervenant :

Moniteur agréé Institut National Recherche Sécurité (INRS) et CRAM.
Formateur expert des questions de sécurité.

L'Organisation :

Lieu : à déterminer

Dates : à déterminer

Horaires : 08h30 – 17h30

Coût par participant :

100,00 € H.T.

Renseignements et inscriptions :

Sabine ACCO

LES OBJECTIFS :

- Mettre en œuvre une réanimation cardio-pulmonaire et, si nécessaire, réaliser en toute sécurité une défibrillation automatisée externe chez une victime inconsciente qui ne respire pas.
- Entraîner les participants de façon pragmatique.

LE CONTENU DE LA FORMATION :**■ PRINCIPE DE L'ACTION DE LA « CHAÎNE DE SURVIE »**

- Reconnaître les signes précurseurs de l'AC et alerte précoce.
- Réanimation cardio-pulmonaire précoce.
- Défibrillation précoce.
- Prise en charge médicale précoce.

La mise en place immédiate de la chaîne de survie fait passer les chances de survie immédiate de 4% à 40%.

■ METTRE EN OEUVRE LE DEFIBRILLATEUR

- **La victime ne respire pas**
- **Préliminaires :** Après avoir réalisé la protection, puis contrôler les saignements, la conscience, apprécier la respiration sans oublier de libérer les voies aériennes
- **Pratiquer la RCP : compressions, insufflations.**
- **Défibrillation.**

■ LE DAE

- Qu'est ce qu'un DAE ?
- De quoi se compose t il ?
- Quels sont les accessoires qui l'accompagne?
- Où se trouvent il généralement?

■ ENTRAINEMENTS PRATIQUES

- Mettre le DAE en marche.
- Suivre les indications vocales.
- Délivrer le choc.
- Reprendre sans délai les manœuvres de réanimation.
- Continuer à suivre les recommandations du DAE jusqu'à l'arrivée des secours.
- Traiter les cas particuliers.
- Le DAE chez l'enfant de 1 à 8 ans.